



* Para indivíduos que possam ter estado expostos ao HCV nos últimos 6 meses, ou sobre quem recaiam elevadas suspeitas de infecção por HCV (ex: ALT elevada em pacientes em risco para hepatite C) apesar de resultado negativo para anti-HCV, é recomendado testar para HCV Core Ag ou HCV-RNA. Para pessoas imunocomprometidas, considerar testar para HCV-RNA.

** Para diferenciar uma infecção passada que tenha resolvido de um falso positivo biológico para os anticorpos anti-HCV, pode-se considerar testar com um ensaio diferente de anticorpos, como o Imunoblot Recombinante (RIBA). Repetir o teste HCV-RNA se a pessoa testada é suspeita de ter tido uma exposição ao HCV dentro dos últimos 6 meses ou tem evidência clínica de doença por HCV

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES PARA O VÍRUS DA HEPATITE C (HCV)

Resultado do Teste	Interpretação	Acção posterior
Anticorpos anti-HCV negativos	Não foram detectados anticorpos HCV	A amostra pode ser reportada como anticorpo anti-HCV negativo. Não é necessária nenhuma acção adicional. Se se suspeita de exposição recente ao HCV na pessoa testada, testar para HCV Ag / RNA .
Anti-HCV Positivo	Infecção presuntiva pelo HCV	Um resultado repetidamente positivo é consistente com infecção activa por HCV (aguda ou crónica), ou infecção prévia que tenha resolvido, ou falso positivo biológico dos anticorpos anti-HCV. Testar para HCV Ag / HCV RNA para identificar infecção activa.
Anti-HCV Positivo HCV Ag / HCV RNA Positivo	Infecção activa (aguda ou crónica)	Providenciar conselhos apropriados à pessoa testada e encaminhá-la para os cuidados de saúde adequados e eventual tratamento.
Anti-HCV Positivo HCV Ag / HCV RNA Negativo	Ausência de infecção actual. (Infecção prévia ou falso positivo de anti-HCV).	Na maioria dos casos não é necessária nenhuma acção adicional. Se se pretender distinguir entre verdadeira positividade e falsa positividade biológica para anticorpos anti-HCV, e a amostra é repetida/positivano teste inicial, testar com outro ensaio de anticorpos anti-HCV (RIBA)